

令和6年6月

医療関係者各位

株式会社陽進堂

「使用上の注意」改訂のお知らせ

HMG-CoA 還元酵素阻害剤
—脂質異常症治療剤—
日本薬局方 シンバスタチン錠
シンバスタチン錠 5mg 「YD」
シンバスタチン錠 10mg 「YD」
シンバスタチン錠 20mg 「YD」

今般、自主改訂により下記の通り使用上の注意事項を変更致しましたので、お知らせ申し上げます。
(下線部分が変更箇所です。)

ご使用に際しましては、下記改訂内容をご参照賜りますようお願い申し上げます。

記

〈改訂内容〉

改訂後			改訂前 (____部：削除)		
10. 相互作用 変更なし			10. 相互作用 省略		
10.1 併用禁忌 (併用しないこと)			10.1 併用禁忌 (併用しないこと)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
変更なし			省略		
アタザナビル： レイアタッ ツ サキナビルメ シル酸塩： インビラー ゼ コビシスタッ トを含有する 製剤： ゲンボイヤ プレジコピ ックス シムツーザ [2.4 参照]	横紋筋融解症を 含むミオパチー 等の重篤な副作 用が起きるおそ れがある。	これらの薬剤 は CYP3A4 を 阻害し、本剤の 代謝が抑制され る。	アタザナビル： レイアタッ ツ サキナビルメ シル酸塩： インビラー ゼ コビシスタッ トを含有する 製剤： スタリビル ド ゲンボイヤ プレジコピ ックス シムツーザ [2.4 参照]	横紋筋融解症を 含むミオパチー 等の重篤な副作 用が起きるおそ れがある。	これらの薬剤 は CYP3A4 を 阻害し、本剤の 代謝が抑制され る。

—医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。—

〈改訂理由〉

- ・「併用禁忌」の相手薬剤の記載削除
販売中止品のスタリビルドを削除いたしました。

- DSU No.327(2024年7月発行)掲載予定
- 最新の電子添文につきましては、以下ホームページをご参照ください。
陽進堂ホームページの医療関係者様向けサイト(<https://www.yoshindo.co.jp/>)
医薬品医療機器総合機構のホームページ(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)
- 専用アプリ「添文ナビ」を用いてGS1バーコードを読み取ることで、電子添文を確認頂くこともできます。

シンバスタチン錠「YD」のGS1バーコード



お問い合わせは、担当MR又は弊社医薬営業本部までご連絡ください。
㈱陽進堂 医薬営業本部 ☎ 0120-647-734

以上