

令和6年8月

医療関係者各位

株式会社陽進堂

「使用上の注意」改訂のお知らせ

慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤
トアラセット配合錠「YD」
(トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合錠)

今般、自主改訂により下記の通り使用上の注意事項を変更致しましたので、お知らせ申し上げます。
(下線部分が変更箇所です。)
ご使用に際しましては、下記改訂内容をご参照賜りますようお願い申し上げます。

記

〈改訂内容〉

改訂後			改訂前		
10. 相互作用 変更なし			10. 相互作用 省略		
10.1 併用禁忌 (併用しないこと) 変更なし			10.1 併用禁忌 (併用しないこと) 省略		
10.2 併用注意 (併用に注意すること)			10.2 併用注意 (併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
変更なし			省略		
リネゾリド	変更なし		リネゾリド	省略	
メチルチオニウム塩化物水和物 (メチレンブルー)	セロトニン症候群 (錯乱、激越、発熱、発汗、運動失調、反射異常亢進、ミオクローヌス、下痢等) があらわれるおそれがある。	メチルチオニウム塩化物水和物のモノアミン酸化酵素阻害作用によりセロトニン作用が増強される。	カルバマゼピン フェノバルビタール フェニトイン プリミドン リファンピシン イソニアジド	省略	
カルバマゼピン フェノバルビタール フェニトイン プリミドン リファンピシン イソニアジド	変更なし		省略		
変更なし			省略		

〈改訂理由〉

・「併用注意」への追記

先発製剤において CCDS (企業中核データシート) 変更に伴う改訂が行われたため、本剤においても併用注意にメチルチオニウム塩化物水和物 (メチレンブルー) を追記して注意喚起することといたしました。

—医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。—

- DSU No.329(2024年9月発行)掲載予定
- 最新の電子添文につきましては、以下ホームページをご参照ください。
陽進堂ホームページの医療関係者様向けサイト(<https://www.yoshindo.co.jp/>)
医薬品医療機器総合機構のホームページ(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)
- 専用アプリ「添文ナビ」を用いてGS1バーコードを読み取ることで、電子添文を確認頂くこともできます。

トアラセット配合錠「YD」のGS1バーコード



お問い合わせは、担当MR又は弊社医薬営業本部までご連絡ください。
株陽進堂 医薬営業本部 ☎ 0120-647-734

以上