

令和6年8月

医療関係者各位

株式会社陽進堂

「使用上の注意」改訂のお知らせ

持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤
 日本薬局方 カンデサルタン シレキセチル錠
 カンデサルタン錠 2mg 「YD」
 カンデサルタン錠 4mg 「YD」
 カンデサルタン錠 8mg 「YD」
 カンデサルタン錠 12mg 「YD」

今般、自主改訂により下記の通り使用上の注意事項を変更致しましたので、お知らせ申し上げます。
 (下線部分が変更箇所です。)

ご使用に際しましては、下記改訂内容をご参照賜りますようお願い申し上げます。

記

〈改訂内容〉

改訂後				改訂前			
11. 副作用 変更なし				11. 副作用 省略			
11.1 重大な副作用 変更なし				11.1 重大な副作用 省略			
11.2 その他の副作用 〈高血圧症〉				11.2 その他の副作用 〈高血圧症〉			
	0.1～5%未満	0.1%未満	頻度不明		0.1～5%未満	0.1%未満	頻度不明
変更なし				省略			
その他	倦怠感、脱力感、鼻出血、頻尿、浮腫、咳、血中カリウム上昇、総コレステロール上昇、血中 CK 上昇、CRP 上昇、血中尿酸上昇、血清総タンパク減少	低ナトリウム血症、腰背部痛、筋肉痛	耳鳴、関節痛	その他	倦怠感、脱力感、鼻出血、頻尿、浮腫、咳、血中カリウム上昇、総コレステロール上昇、血中 CK 上昇、CRP 上昇、血中尿酸上昇、血清総タンパク減少	低ナトリウム血症、腰背部痛、筋肉痛	耳鳴
〈慢性心不全〉 変更なし				〈慢性心不全〉 省略			
	5%以上	0.1～5%未満	頻度不明		5%以上	0.1～5%未満	
変更なし				省略			
その他	血中カリウム上昇、血中尿酸上昇、血中 CK 上昇	倦怠感、脱力感、咳、浮腫、視覚異常、総コレステロール上昇、低ナトリウム血症、血清総タンパク減少	関節痛	その他	血中カリウム上昇、血中尿酸上昇、血中 CK 上昇	倦怠感、脱力感、咳、浮腫、視覚異常、総コレステロール上昇、低ナトリウム血症、血清総タンパク減少	

—医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。—

〈改訂理由〉

・「その他の副作用」への追記

先発製剤において症例集積及び CCDS（企業中核データシート）変更に伴う改訂が行われたため、本剤においても「その他の副作用」に関節痛を追記して注意喚起することといたしました。

- DSU No.329(2024年9月発行)掲載予定
- 最新の電子添文につきましては、以下ホームページをご参照ください。
陽進堂ホームページの医療関係者様向けサイト(<https://www.yoshindo.co.jp/>)
医薬品医療機器総合機構のホームページ(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)
- 専用アプリ「添文ナビ」を用いて GS1 バーコードを読み取ることで、電子添文を確認頂くこともできます。

カンデサルタン錠「YD」のGS1バーコード



お問い合わせは、担当 MR 又は弊社医薬営業本部までご連絡ください。
（株）陽進堂 医薬営業本部 ☎ 0120-647-734

以上